

粪便样本采集

无需预订

Chinese (simplified) | 中文 (简体)



如果粪便样本未冷藏或送至PathWest的时间有延迟，样本中的细菌可能会大量繁殖。这会影响检测结果，您可能需要重新进行检测。



扫描位置

您应该已收到用于盛放样本的无菌容器。如果容器破损或您已触摸过其内壁，请申请更换新容器。

1. 在进行采集之前，将膀胱内的尿液全部排入马桶。
2. 将粪便样本收集到干净的无菌冰淇淋容器（或类似容器）中。或者，也可以将粪便样本收集到干净的保鲜膜上，然后小心地将其覆盖在马桶上。
3. 使用无菌收集容器盖上的勺子功能，舀取一勺粪便样本，并将其放入无菌容器中。
4. 确保粪便样本收集容器的盖子盖紧，以避免任何可能的泄漏。
5. 请在样本上贴上您的全名、出生日期以及样本采集的日期和时间标签。
6. 每个样本需要在采集后 12 小时内送至 PathWest。
7. 如果医生要求采集多份粪便样本，则应在不同的排便时间进行采集。
8. 如果需要采集粪便隐血样本并需要使用缓冲管保存样本，请参考 PathWest 的粪便隐血说明。

样品处理、储存和运送

准备一个无菌容器
清洗并擦干合适的塑料收集容器，例如冰淇淋容器或大酸奶容器。


如果在收集中心
将容器放入提供的塑料袋中，然后交给工作人员。

在家采集样本
请在一小时内将样本送至 PathWest 采集中心。如果无法立即送达，请将样本放入密封袋中，并在冰箱（而非冷冻室）中保存最多 12 小时。

粪便隐血样本采集

无需预订

Chinese (simplified) | 中文 (简体)



如果粪便样本未冷藏，或送至PathWest的时间有延迟，且未使用缓冲管保存样本，则样本质量会下降。这可能会影响您的检测结果，您可能需要重新进行检测。



扫描位置

您应该已收到用于采集每个样本的无菌容器。如果容器破损或您已接触过内壁，请申请更换新容器。如果将每个样本送至PathWest采集中心可能会出现延误，您可以获得缓冲管以保存每个采集的样本。

1. 将粪便收集到干净的容器（例如塑料冰淇淋容器）中，并按照本说明书背面步骤 3 将样本放入无菌收集容器中。
2. 在标本收集容器和 Hemotrust 稀释缓冲液（如上图所示）上贴上您的全名、出生日期以及样本采集的日期和时间标签。
3. 拧开缓冲管顶部的蓝色盖子，取出涂抹棒。
4. 将涂抹棒分别插入标本收集罐中粪便样本的三个不同位置。样本只需非常小——比一粒米还小。
5. 将涂抹棒放回缓冲管中并拧紧，确保粪便标本收集容器的盖子拧紧，以避免任何可能的泄漏。
6. 用力摇晃缓冲管，使溶液混合均匀。
7. 请尽快将标本采集容器和缓冲液管送至PathWest实验室或采集中心。在送达之前，请将采集容器和缓冲液管保存在冰箱中。
8. 如果医生要求采集多份粪便样本，则应在不同的排便时间进行采集。

样品处理、储存和运送

如果您在收集中心将容器放入提供的塑料袋中，然后交给工作人员。

如果您在家采集样本请在一小时内将样本送至PathWest 采集中心。如果无法立即送达，或者需要采集多个样本进行粪便隐血检测，请将接种了血细胞的 Hemotrust 缓冲液管（请咨询您当地的PathWest 采集中心）放入密封袋中，并在冰箱（而非冷冻室）中保存最多 72 小时。