

幽门螺杆菌呼气 试验

无需预订

Chinese (simplified) | 中文 (简体)



我们的大多数采集中心在上午都会出现高峰时段。有些患者需要进行紧急或有时效性的检测，因此我们并非总是按照到达顺序安排患者。您或许更愿意在当天晚些时候前来接受检测。



扫描位置

测试之前

- 以下列出了可能影响检测结果的药物。请在检测前的隔离期内避免服用这些药物。如有任何疑问，请咨询您的医生。
- 测试前至少需要禁食四个小时。
- 这意味着不能摄入任何液体（包括水）或食物，包括茶、咖啡、果汁、牛奶、口香糖或止咳糖，因为这些都会影响检测结果。

排除期	药物类型
测试前 4 周	抗生素
测试前两周	蔗糖铝
测试前一周	质子泵抑制剂
斋戒期	禁止进食、饮水（包括水）或服用任何药物

在收集中心

- 您将被要求用20毫升水送服一粒含有少量尿素的胶囊。如果您吞咽胶囊有困难，请告知我们的工作人员。
- 等待三分钟后，您将被要求喝下第二杯 20 毫升的水。
- 然后您需要再等待 7 分钟，然后对着气球呼气。
- 然后将气球送往实验室进行分析。

***请在考试期间保持坐姿**