

Tampone genitale per la rilevazione dello streptococco di gruppo B

NON È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Italian | Italiano




Se effettuate il prelievo a domicilio, portate il campione presso un centro di raccolta PathWest il prima possibile. Qualora non fosse possibile la consegna immediata, conservate il campione a temperatura ambiente (non in frigorifero o nel congelatore) per un massimo di 24 ore.



Cerca le posizioni

Come raccogliere il proprio campione

1. Richiedi un tampone al tuo medico o al centro di prelievo PathWest più vicino ed etichetta la provetta con il tuo nome completo, la data di nascita, la data e l'ora del prelievo e la dicitura "LVS & Rectal".
2. Lavatevi accuratamente le mani con acqua e sapone e asciugatele bene prima di prelevare il campione.
3. Aprire con cautela la confezione del tampone, facendo attenzione a non toccare la punta di cotone, e assumere una posizione comoda, seduti o in piedi.
4. Divaricare le labbra e inserire delicatamente il tampone di cotone per 2 cm (circa la lunghezza di una falange di un dito) nella vagina. Ruotare delicatamente il tampone per 30 secondi per raccogliere un campione adeguato.
5. Estrarre il tampone, quindi inserirlo attraverso lo sfintere anale, per 2 cm nel retto, ruotandolo delicatamente per altri 10 secondi.
6. Ritirare il tampone, riporlo direttamente nel suo contenitore e lavarsi le mani.
7. Inserite il contenitore nel sacchetto di plastica fornito e consegnatelo a un addetto di PathWest se vi trovate presso il centro di raccolta.



Avvertenza: questa pubblicazione è a scopo informativo e didattico generale. Per qualsiasi consiglio medico, si prega di contattare un professionista sanitario qualificato.

© Stato dell'Australia Occidentale, PathWest Laboratory Medicine WA 2026