

ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ



ਜੇਕਰ ਮਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਫਰਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਥਵੈਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਜੀਵ ਕੰਟੇਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਟੇਨਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

1. ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿਓ।
2. ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਨਿਰਜੀਵ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਦੇ ਡੱਬੇ (ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਸਟੀਰਾਈਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟੀਰਾਈਲ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
4. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਢੱਕਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
5. ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ।
6. ਹਰੇਕ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਥਵੈਸਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਲ ਦੇ ਕਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
8. ਜੇਕਰ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਗੁਪਤ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਫਰ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਥਵੈਸਟ ਦੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਗੁਪਤ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੇਖੋ।

ਨਮੂਨਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ

ਇੱਕ ਨਿਰਜੀਵ ਕੰਟੇਨਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਨਰ, ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਕਾਓ।


ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਪਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ
ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਾਥਵੈਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੀਲਬੰਦ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਫਰਿਜ (ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ) ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

ਮਲ ਗੁਪਤ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ



ਜੇਕਰ ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਫਰਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਥਵੈਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਬਫਰ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਜੀਵ ਕੰਟੇਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਟੇਨਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਪਾਥਵੈਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਫਰ ਟਿਊਬਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

1. ਮਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਡੱਬੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਈਸ-ਕ੍ਰੀਮ ਡੱਬੇ) ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਜੀਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਰੱਖੋ।
2. ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ ਹੋਮੋਟਰਸਟ ਡਾਇਲੂਏਂਟ ਬਫਰ (ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੇਬਲ ਕਰੋ।
3. ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਸਟਿੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਫਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਨੀਲੇ ਕੈਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
4. ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਸਟਿੱਕ ਪਾਓ। ਨਮੂਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ।
5. ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਸਟਿੱਕ ਨੂੰ ਬਫਰ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪੇਚ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਢੱਕਣ ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੱਸ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
6. ਘੋਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬਫਰ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਹਿਲਾਓ।
7. ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ ਬਫਰ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਥਵੈਸਟ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਫਰ ਟਿਊਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
8. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਲ ਦੇ ਕਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨਮੂਨਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਸੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਪਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਥਵੈਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਲ ਗੁਪਤ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਮੋਟਰਸਟ ਬਫਰ ਟਿਊਬ (ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਥਵੈਸਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ) ਨੂੰ ਫਰਿਜ ਵਿੱਚ (ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ) 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੀਲਬੰਦ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।