

ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਸਾਹ ਟੈਸਟ

ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ



ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

- ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ। ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
- ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ (ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ) ਜਾਂ ਭੋਜਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹ, ਕੋਫੀ, ਜੂਸ, ਦੁੱਧ, ਚਿਊਇੰਗਮ ਜਾਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ

ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਿਆਦ	ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਟੈਸਟ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ	ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ
ਟੈਸਟ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ	ਸੁਕ੍ਰਾਲਫੇਟ
ਟੈਸਟ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ	ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪੰਪ ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ
ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ	ਕੋਈ ਖਾਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ (ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ), ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ

ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ

- ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮਿ.ਲੀ. ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯੂਰੀਆ ਵਾਲੀ ਕੈਪਸੂਲ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
- ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮਿ.ਲੀ. ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੱਪ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ।
- ਫਿਰ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹੋ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
© ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਾਜ, ਪਾਥਵੈਸਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨ WA 2026