

Thu thập mẫu phân

KHÔNG CẦN ĐẶT CHỖ TRƯỚC

Vietnamese | Tiếng Việt



Nếu mẫu phân không được bảo quản lạnh hoặc bị chậm trễ trong việc vận chuyển đến PathWest, vi khuẩn trong mẫu có thể sinh sôi nảy nở. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm và bạn có thể được yêu cầu làm lại xét nghiệm.



Quét tìm địa điểm

Bạn sẽ được cung cấp một hộp đựng mẫu vô trùng. Nếu hộp đựng bị vỡ hoặc bạn đã chạm vào bề mặt bên trong, vui lòng yêu cầu một hộp đựng mới.

1. Trước khi tiến hành thu thập mẫu, hãy làm rỗng bàng quang và đi tiểu hết vào bồn cầu.
2. Thu thập mẫu phân vào hộp đựng kem sạch, vô trùng (hoặc vật dụng tương đương). Hoặc, có thể thu thập mẫu phân lên màng bọc thực phẩm sạch rồi cẩn thận đặt lên bồn cầu.
3. Sử dụng chức năng xúc mẫu trên nắp hộp đựng mẫu vô trùng, xúc một lượng mẫu phân và cho vào hộp đựng vô trùng.
4. Hãy đảm bảo nắp hộp đựng mẫu phân được đậy kín để tránh rò rỉ.
5. Hãy ghi rõ họ tên đầy đủ, ngày sinh cũng như ngày và giờ lấy mẫu lên mẫu vật.
6. Mỗi mẫu cần được chuyển đến PathWest trong vòng 12 giờ kể từ khi được thu thập.
7. Nếu bác sĩ yêu cầu lấy nhiều mẫu phân, các mẫu này nên được lấy từ các lần đi đại tiện khác nhau.
8. Nếu cần lấy mẫu máu ẩn trong phân và phải sử dụng ống đệm để bảo quản mẫu, hãy tham khảo hướng dẫn về máu ẩn trong phân của PathWest.

Xử lý, bảo quản và vận chuyển mẫu

Chuẩn bị một hộp đựng vô trùng.

Làm sạch và lau khô một vật chứa bằng nhựa phù hợp, chẳng hạn như hộp đựng kem hoặc hộp đựng sữa chua lớn.

Nếu tại trung tâm thu gom

Đặt hộp đựng vào túi nhựa được cung cấp và đưa cho nhân viên.


Lấy mẫu tại nhà

Hãy mang mẫu đến trung tâm thu gom của PathWest trong vòng một giờ. Nếu không thể giao ngay, hãy bảo quản mẫu trong tủ lạnh (không phải ngăn đá) trong tối đa 12 giờ trong một túi kín khác.

Thu thập mẫu máu ẩn trong phân

KHÔNG CẦN ĐẶT CHỖ TRƯỚC

Vietnamese | Tiếng Việt



Nếu mẫu phân không được bảo quản lạnh hoặc bị chậm trễ trong việc vận chuyển đến PathWest và mẫu không được bảo quản bằng ống đệm, chất lượng mẫu sẽ bị suy giảm. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả và bạn có thể được yêu cầu làm lại xét nghiệm.



Quét tìm địa điểm

Bạn sẽ được cung cấp một hộp đựng vô trùng cho mỗi mẫu cần thu thập. Nếu hộp đựng bị vỡ hoặc bạn đã chạm vào bề mặt bên trong, vui lòng yêu cầu một hộp đựng mới. Nếu có khả năng xảy ra chậm trễ trong việc vận chuyển từ mẫu đến trung tâm thu thập của PathWest, bạn có thể được cung cấp các ống đệm để bảo quản từng mẫu thu thập.

1. Thu gom phân vào một vật chứa sạch (ví dụ: hộp đựng kem bằng nhựa) và đặt mẫu vào vật chứa vô trùng theo bước 3 ở mặt sau của tờ hướng dẫn này.
2. Hãy ghi rõ họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh cũng như ngày và giờ lấy mẫu lên hộp đựng mẫu và dung dịch pha loãng Hemotrust (như hình trên).
3. Vặn nắp màu xanh ở đầu ống đệm để lấy que bôi thuốc ra.
4. Đưa que lấy mẫu vào mẫu phân trong lọ đựng mẫu tại ba vị trí khác nhau. Mẫu chỉ cần rất nhỏ - nhỏ hơn hạt gạo.
5. Đặt lại que bôi vào ống đệm và vặn chặt nắp, đảm bảo nắp được đóng kín vào hộp đựng mẫu phân để tránh rò rỉ.
6. Lắc mạnh ống đựng dung dịch đệm để trộn đều dung dịch.
7. Hãy chuyển hộp đựng mẫu và ống đệm đến phòng thí nghiệm hoặc trung tâm thu thập mẫu của PathWest càng sớm càng tốt. Bảo quản cả hộp đựng mẫu và ống đệm trong tủ lạnh cho đến khi có thể giao đến nơi.
8. Nếu bác sĩ yêu cầu lấy nhiều mẫu phân, các mẫu này nên được lấy từ các lần đi đại tiện khác nhau.

Xử lý, bảo quản và vận chuyển mẫu

Nếu bạn đang ở trung tâm thu gom

Đặt hộp đựng vào túi nhựa được cung cấp và đưa cho nhân viên.

Nếu bạn đang lấy mẫu tại nhà

Hãy mang mẫu đến trung tâm thu gom của PathWest trong vòng một giờ. Nếu không thể giao ngay hoặc nhiều mẫu được yêu cầu để xét nghiệm máu ẩn trong phân, hãy bảo quản ống dung dịch đệm Hemotrust đã được cấy mẫu (hỏi trung tâm PathWest địa phương của bạn về loại ống này) trong tủ lạnh (không phải tủ đông) trong tối đa 72 giờ trong một túi kín khác.